JOURNAL

für

ORNITHOLOGIE.

Dritter Jahrgang.

Nº 18.

November.

1855.

Systematisches Verzeichniss der Vögel Afrika's.

Von

Baron Dr. J. W. v. Müller.

(Fortsetzung von S. 385-400.)

5. FAMILIE LANIIDAE.

1. Subfam. Laniinae.

569. Lanius excubitor L.

L. cinereus Br. — Gould Birds Eur. t. 66. — Naum. Vögel Deutschl. t. . . — Pl. enl. 445.

lm nördlichen Afrika.

570. Lanius meridionalis Temm.

Pl. col. 143. — Roux Orn, prov. t. 153. — Gould Eur. t. 67. — Susem. Vög. Eur. t. 15.

In Nord-Ost-Afrika bis Sennaar.

571. Lanius minor Gm.

Enneoctonus italicus Bp. — Enneoct. minor Cab. — Lan. vigil Pall. — L. italicus Lath. — L. longipennis Blyth. — Pl. enl. 32. 1. — Gould Eur. t. 68. — Roux Orn. prov. t. 51.

In Nord-Ost-Afrika, südwärts bis Sennaar und Abyssinien.

572. Lanius personatus Temm.

L. brubru Sibthroop. — L. nubicus Licht. — L. leucometopon v. d. Mühle. — Enneoctomus nubicus Cab. — Pl. col. 216. 2. — Susemihl V. Eur. t. 17. 1.

Standvogel im nordöstlichen Afrika, südwärts bis Abyssinien, Sennaar und Kordofan.

573. Lanius algeriensis Less.

Rev. Zool, 1839. p. 134. — Bonap. Monogr. des Laniens (Rev. de Zool, 1853. p. 293.)
In Nord-Afrika.

Journ, f. Ornith., III. Jahrg., Nr. 18, November 1855.

574. Lanius princeps Cab.

Mus. Hein. I, p. 73. — L. excubitorius O des Murs. — L. macrocercus Defilippi. — Lefevr. Voy. Abyss. p. 89. t. 8. Ost- und Central-Afrika.

575. Lanius pallidirostris Cassin.

Proceed. Acad. nat. sc. Philadelph. 1851. p. 244. — L. dealbatus Defilippi. Bonap. Laniens Rev. zool. 1853. p. 294. Vom weissen Nil.

576. Lanius collaris Lin.

Pl. enl. 477. 1. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 61. 62. — Jard. and Selby Ill. Orn. t. 52. 53.
In Südafrika und Abyssinien.

577. Lanius fiscus Cab.

L. collaris Rüpp. — L. Arnaudi O des Murs. — Cab. Mus Hein. p. 74. — Bp. Rev. zool. 1853. p. 434. Abyssinien.

578. Lanius subcoronatus Smith.

Ill. S. Afr. Zool. Av. t. 68. Am Cap.

579. Lanius afer Lath.

Lanius signatus Shaw. Gr. Gen. of Birds p. 291. sp. 20. Südafrika.

580. Lanius Smithii Gr.

Collurio Smithii Fras. Proc. Zool. Soc. 1843. p. 16. — Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 312. — Jard. Contrib. 1849. p. 8. Cap Coast und Gaboon.

581. Enncoctonus (Boie) collurio (Lin.)

Lan. spinitorquus Bechst. — L. aeruginosus Klein. — Buff. enl. 31. — Gould Birds Eur. t. 69. — Le Vaill. Afr. t. 64. — Naum. V. D.

Nord-Ost-Afrika bis Sennaar

582. Enneoctonus rufus (Lin.)

Lan. ruficollis Shaw. — L. rutilus Lath. — L. ruficeps Bechst. — L. pomeranus Sparm. — Pl. enl. 9. 2 et 31. 1. — Gould Birds Eur. t. 70.

In Nord-Ost-Afrika. Nach Swainson in Senegambien und fast ganz Afrika

583. Enneactonus pectaralis v. Müll.

Simillimus \dot{En} . rufo, sed pectore cinnamomeo, speculo alari minore. Sennaar.

584. Euneactonus Jardinii v. Müll.

Simillimus En. rufo, sed rectricibus 2 mediis externis dimidiato albis. Sennaar und Nubien.

585. Enneoctorus rutilans Cab.

Lanius rutilans Temm. — L. superciliosus Licht. Doub. p. 47. — L. erythroptcrus Rüpp. — Pl. enl. 477. 2. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 63. 1 und 2. — Hartl. Synops. sp. 253. Senegambien.

586. Enneoctonus badius Hartl Synops. sp. 254. Goldküste.

587. Enneoctonus niloticus Bp. Rev. zool. 1853 p. 439. Vom weissen Nil.

588. Nilaus brubru Sws.

Lan. brubru Lath. — L. capensis Shaw. — L. frontalis Forst. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 71. 1, 2. — Licht. Doubl p. 48. — Hartl. Synops. sp. 251.

In Sud- und West-Afrika, Abyssinien, Kordofan und Nubien.

589. Corvinella corvina Less.

Lan. corvinus Sh. — L. cissoides Vieill, nec Licht — L. mellivorus Licht. — L. flavirostris Sw. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 78. — Hartl. Synops. sp. 256.

Südafrika, Goldküste, Senegambien, am oberen weissen Nil

590. Urolestes melanoleucus Cab

Lan. cissoides Gr. — L. melanurus Licht, — L. melanoleucos Smith. — Basanistes cissoides Licht. — Jard. et Selb. Ill. Orn. t. 117. — Mag. Zool. 1837. Ois. t. 61.

Kasserei.

591. Oxynotus ferrugineus Sws.

Lanius ferrugineus Gm. - Vog. Uranie t. 17.

Insel St. Maurice.
592. Sigmodus canicers Temm.

Schleg. Naum. II. 2. p. 27. — Hartl. Cab. Journ. f. Ornith. I. p. 32. — Jard. Contrib. 1852. t 95.

Goldküste.

593. Sigmodus rufiventris Bonap.

Rev et Mag. de Zool. 1853. p. 441.

Gaboon.

594. Eurocephalus anguitimens Smith Chaetoblemma leucocephala Sws. — III. S. Afr. Zool. Südafrika.

595. Eurocephalus Rüppelli Bonap. Euroc. auguitimeus Rüpp System. Uebers. N O. A t. 27. In Abyssinien und am weissen Nil.

596. Prionops (Vieill.) plumatus (Shaw.)

Pr. Geoffroyi Vieill. — Lan. plumatus Sws. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 80, 81. — Vieill. Gal. d'Ois. t. 142. — Sws. B. of W.Afr. t. 26. Senegambien.

597. Prionops poliocephalus Gr.

Lan. poliocephalus Stanley. - Prionops cristatus Rupp. Neue Wirbelth t 12. 2.

Ahyssinien und Sennaar.

598. Prionops thalacoma Smith. Ill. S. Afr. Zool, av. t. 5.

Südafrika, wahrscheinlich auch in Abyssinien.

599. Tephrodornis (Sws.) ocreatus Strickl.

Proc. Zool. Soc. 1844. p. 102. — Allen Exp. Nig. II. p. 489. — Hartl. Synops, sp. 233.

Fernando Po.

600. Telephonus (Gr.) senegalus Gr.

Lanius senegalus L — L. senegalensis Briss. Orn. II. t 17. 1. Pomatorhynchus senegalus Cab. — Pl. enl. 297. 1 Senegambien, Damara.

601. Telephonus cucullatus Gr.

Lanius cucullatus Temm. — L. senegalus Licht. — Susem. V. E. II. t. 17. 2.

In Nordafrika?

602. Telephonus aethiopicus Lath.

Rüpp Uebers, der Vög. N.O.Afr. t. 23. Abyssinien.

603. Telephonus erythropterus Sws.

Lanius erythropterus Shaw. — L. melanocephalus Temm. — Thamnophilus tschagra Vieill. — Pomatorhynchus erythropterus Cab. — Pl. enl. 479. 1. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 70.

Abyssinien, Sennaar, Kordofan, nördlich bis Wadi-Halfa (Nubien), Senegambien und Südafrika.

604. Telephonus longirostris Sws.

Lanius tschagra Rüpp. — Harpolestes longirostris Cab. Mus. Hein. I. p. 70. — Sws 2. Cent. and a Quart. p. 282. Ostafrika (?).

605. Telephonus trivirgatus Sm.

Melacanotus australis Sm. III, S. Afr. Zool. t. 94 fem. Südafrika

606. Telephonus zeilonus L.

Lan. Bakbakiri Vieill. — L. collaris Sws. — L. ornatus Licht. — Buff. enl 272. — Edw Birds 321. — Le Vaill. Afr. 67. Südafrika.

2. Subfam. TAMNOPHILINAE. (Dryoscopus Boie.)

607. Laniarius cubla Gr.

Dryoscopus cubla Boie. — Lanius cubla Shaw. — Malonotus cubla Sundev. — Le Vaill. Ois d'Afr. 72. 1 et 2. Sudafrika, Abyssinien und Sennaar.

608. Laniarius gambensis Gr.

Malacon, mollissimus Sws. — Lan. gambensis Licht. — Sws. Birds of W. Afr. I. t. 23. — Hartl. Synops. sp. 243. Senegambien, Sierra Leone.

609. Laniarius affinis Gr.

Ann. Nat. Hist. 1837, p. 489.

610. Laniarius orientalis Gr.

Malacon, orientalis et similis Sws. Two Cent. and a Quart. p. 342. — Dryoscopus orientalis Cab.

611. Laniarius bulbul Lath.

Lanius cafer Forst. — Malacon, rufiventris Sw. — Malacon, boulboul Cab. — Le Vaill, Ois. d'Afr. t, 68.

West? - und Südafrika.

612. Laniarius aethiopicus (Gm.)

Turdus aethiopicus Gm. Lath. — Telephonus aethiopicus Rüpp. — Melaconotus aethiopicus Cab.

Abyssinien, Kordofan.

613. Laniarius madagascariensis Gr.

Lanius madagascariensis L. — Pl enl. 299. 1 et 2. Madagascar.

614. Laniarius bicolor Gr.

Lanius bicolor L. — L. madagascariensis coeruleus Br. — Pl. enl. 298. 1. — Le Vaill. Ois d'Afr. t. 73. 1. 2. 3. Madagascar.

615. Laniarius Sabini Gr.

Dryoscopus Sabini J. E. Gray. — Chaunonotus Sabini Gr. — Hapalophus melanoleucus Verr. Rev. de Zool. 1851. p. 312 — Jard. Selb. Ill. sec. ser. pl. 27. — Hartl Synops. sp. 244. Sierra Leone, Gaboon.

616. Laniarius major Hartl.

Thelephonus major Hartl Rev. Zool. 1848. p. 108. — Hartl. Beitr, zur Orn W. A. t. 5. — Id Synops. sp. 245. Goldküste.

617. Laniarius leucorhynchus Hartl.

Teleph. leucorhynchus Hartl Rev. Zool. 1848. p. 108. — Dryoscopus leucorh. Hartl. Syn. sp. 246. — Id. Beitr. z. Orn. W.A. t. 6.

618. Laniarius carbonarius Cassin.

Proc. Acad. Phil. 1851. p. 347. Sierra Leone.

(Laniarii Vieill.)

619. Laniarius barbarus Vieill.

Malaconotus barbarus Sws. — Lanius barbarus L. — Pl. enl. 56. — Le Vaill. Ois. d'Afr t. 69. — Sws. Zool. Ill. t. 71. Nord-, West- und Süd-Afrika.

620. Laniarius atrococcineus (Burch.)

Zool, Journ. 1. t 28. — Sws. Zool. III. t. 72. Südafrika.

621. Laniarins (Gr.) cruentatus Rüpp.

Malaconotus roseus Jard. — M. erythrogaster Sws. — Rüpp. Atl t. 29. — Ehrenb. Symb. Phys. t. 3.

Abyssinien.

622. Laniarius (Gr.) olivaecus (Shw.)

Lanius oleaginus Vieill. - Malac. olivaccus Sws. - Chlorophoneus olivaccus Cab. Mus Hein. l. p. 71. - Le Vaill. Ois. d'Afr. 75. 1 et 76. 1.

In Süd-, Ost- und Central-Afrika, nordwärts bis Nubien.

623. Laniarius rubiginosus nob.

Malaconotus rubiginosus Sundev. — Chlorophoneus rubiginosus Cab. — Le Vaill Ois. d'Afr. 75 2.

624. Laniarius similis Gr.

Malaconotus similis Smith — M. aurantiopectus Less. — M. affinis Less. — M. chrysogaster Sws. — Chlorophoneus similis Cab. — Hartl. Synops sp. 236. — Sm. III S. Afr. Zool. t. 46. fem — Sws. Birds of W. Afr. t. 25.

Mit Ausnahme der Nordküstenländer über ganz Afrika verbreitet.

625. Laniarius leucotis Gr.

Melaconotus leucotis Sws. Two Cent and a Quart p. 341. Süd? - Afrika.

626. Laniarius (Gr) superciliosus Sws.

Malac. superciliosus Sws. Birds of W. A. I. p. 239. - Hartl. Synops. sp. 237.

Gambia.

627. Laniarius gutturalis Gr.

Lanius gutturalis Daud. — L. viridis Vieill. — Malaconot. torquatus Sws. — Telephonus gutturalis Cab. — Daud. Ann. du Mus. III t. 15. — Le Vaill. Ois d'Afr. t. 286. — Vieill. Gal. t. 143. — Hartl. Synops. sp. 242.

Congo.

628. Laniarius chrysogaster Bonap.

Turd. chrysogaster Gr. – Laniar. erythrogaster Gr. – Pl. enl. 358. – Rüpp. Atl. t. 29.

Abyssinien, Sennaar, Kordofan

629. Laniarius icterus Gr.

Vanga ictera Cuv. — Lan. olivaceus Vieill. nec Shw. — Lan. poliocephalus Licht. — Malaconotus Blanchoti Steph. — Archolestes icterus Cab. — Le Vaill. Ois d'Afr. t 185. — Sws. Birds of W. Afr. I t. 22. — Vieill. Gal. t. 139. — Hartl. Syn. sp. 238. Senegambien, Süd- und Ost-Afrika.

630. Laniarius hypopyrrhus Hartl.

Archolestes hypopyrrhus Cab. Mus. Hein. p. 71. — Hartl. Verz. Brem. Samml. p. 61. — Id. Syn. sp. 239.

Gambia, Algoabay.

631. Laniarius rubrigaster Vieill.
Dict. d'Hist Nat. XIII. p 300.
Süd? - Afrika.

632. Laniarius cruentus (Less.) Gray.

Less. Cent. Zool. t. 65. — Id. Zool. de Belang. p. 256. — Hartl. Synops. sp. 240. Cap.

633. Laniarius mystaceus Gr.

Lanius mystaceus Lath. — Le Vaill, Ois, d'Afr. t. 65. Südafrika.

634. Laniarius multicolor Gr.

Gen. of Birds t. 72.

Südafrika.

635. Laniarius Peli Bonap.

Consp. p. 360. - Hartl. Synops. sp. 241.

Ashantee.

636. Vanga (Vieill.) curvirostris nob.

L. curvirostris Lin. — Thann, leucocephalus Vieill. Pl. enl. 328. Madagascar.

637. Vanga xenopirostris Lafr.

Xenopirostris Lafresnayi Bp. Rev. Mag. de Zool. 1850. t. 1. 1 et 2. Madagascar.

D. Conirostres.

I. FAM. CORVIDAE.

1. Subfam. GARRULINAE.

638. Garrulus melanocephalus Bonelli.

Garr. atricapillus Geoffr. — G. iliceti Mus. Berol. — Pica stridens Ehrenb. — Géné Mem. Acad. Tour. XXXVII. t. 1. — Le Vaill. jun. Explor. Alger. t. 6.

In Algerien, Arabien und Syrien gefunden, in Egypten nie von

mir bemerkt.

2. Subl'am. CALLAEATINAE.

639. Ptilostomus senegalensis Sws.

Corvus afer Gm. — Pica senegalensis Briss. — Corvus senegalensis L. — Pica nigra Vieill. — Cryptorhina piapiac Wagl. — Lanius acuticandatus Vieill. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t 54. — Pl. enl. 538.

Senegamhien.

640. Ptilostomus poecilorhynchus Gray.

Cryptorhina poecilorhyncha Wagl. Syst. Avium sp. 2. — Hartl. Synops. W. Afr. sp. 260. — Bonap. Consp. p. 369.

Senegambien.

641. Ptilostomus rufigaster Lath.

Corvus octopennatus Daud. — C. ventralis Shaw. — Le Vaill. Ois d'Afr. t. 55.

Südafrika.

3 Subfam. CORVINAE

642. Pica caudata Ray.

Corvus pica L. P. europaca Cuv. — C. melanoleuca et albiventer Vieill. — Pl. enl. 488. — Gould Birds of Eur. t. 216.
Nach Rüppell im Winter in Egypten

643 Pica mauritanica Malh.

Mem. Soc. Hist Nat. Metz 1843. — Cat. des Ois. Alger. p. 7. — Explorat de l'Alg. t. 35.

Nordafrika.

644. Pica cyanca Cook nec Pall.

Cyanopica europaea Schl. — Gould Birds Eur. t. 217. — Susem. V. Eur. t. 5. — Dolometis Cooki Cab.

Nord-West-Afrika

645. Corvus major Vieill.

C. montanus Temm. — C. corax Daud.—Le Vaill. Ois d'Afr. t. 51. Südafrika.

646. Corvus corone Lin.

Pl enl. 495. — Gould Birds of Eur. t. 221. — Naum. Vgl. D. t. Im Winter zuweilen in Nordafrika.

647. Corvus affinis Rüpp.

Neue Wirbelth, t. 10, 2, In Kordofan und Abyssinien.

648. Corvus umbrinus Hedenb.

In Egypten, Nubien, Sennaar, Kordofan, Abyssinien und Arabien.

649. Corvus brevicaudatus v. Müll. (1849.)

Dieser merkwürdige und ausgezeichnete Rabe, den man schon im Fluge leicht unterscheidet, wurde von mir 1848 in Kordofan entdeckt, wo ich ein gepaartes Paar von ihm erhielt. Er wird in meinen "Beiträgen zur Ornithologie Afrika's" beschrieben und abgebildet werden. Der im "Journal für Ornithologie, 1854, 1. Heft, S. 75, von A Brehm unter dem Namen C. brachyurus angeführte Rabe ist vielleicht mit C. brevicaudatus Nob. identisch.

650. Corvus frugilegus Lin.

Pl. enl. 483, 484. — Gould Birds of Eur. t. 224. — Naum. V. D. t. . Erscheint häufig auf dem Zuge in Nord-Ost-Afrika.

651. Corvus capensis Licht.

C. segetum Temm. — C. macropterus Wagl. — C. Le Vaillantii Less. — Rüpp. Neue Wirbelth. t. 10. — Le Vaill. O. d'Afr. t. 52. Aus Südafrika und Abyssinien.

652. Corvus cornix L.

Pl. enl. 76. — Gould Birds Eur. t. 22. — Naum. V. D. t. Häufig in Egypten, aber nicht südlicher.

653. Corvus monedula L.

Pl. enl. 523. — Gould Birds of Eur. t. 223. — Naum V. D. t. Selten in Unter-Egypten?

654. Corvus scapulatus Daud.

Pl. enl. 327. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 53.

Vom südlichen bis zum nordöstlichen Afrika, mit Ausnahme des Nordens und Nordwestens.

655. Corvus phaeocephalus Cab. Mus. Hein. I, p. 232.

Abyssinien.

656. Corvus curvirostris Gould.

C. leuconotus Sws. Birds of W. Afr. 1, t 5. — Jard. et Selb. III. new. ser. t. 33. — Hartl. Synops. W. Afr. sp. 261.

Senegambien, Fernando Po, Cap Coast.

657. Corvultur (Less.) albicollis (Lath.)

Corvus cafer Licht — C. vulturiuus Shaw. — Le Vaill. Ois.

d'Afr. t. 50. — Archicorax cafer Cab.

Siidafrika

658. Corvultur crassirostris Rüpp.

N. Wirbelth. t. 8. — Archicorax crassirostris Cab. In den abyssinischen Gebirgen.

659. Picathartes (Less.) gymnocephalus (Temm.)

Corvus gymnocephalus Temm. — Pica gymnocephala Schinz. — Galgulus gymnoceph. Wgl. — Pl. col. 327. — Schinz Vgl. t 16. Von Sierra Leone und dem inneren Südafrika.

4. Subfam. FREGILINAE.

660. Fregilus graculus Cuv.

Corvus graculus L. — C. erythroramphus Vieill. — Pyrrhocorax graculus Temm. - Freg. europaeus Less. — Freg. erythropus Sws. — Corac. gracula Degl. — Pl. eul 225. — Vieill. Gal. des Ois. t. 103. — Gould Birds of Eur. 219. — Naum. V. D. t.

Nach Rüppell "in kleinen Familien auf den höchsten Bergen von

Arabien und Abyssinien."

II. FAM. STURNIDAE.

1. Subfam. PTILONORHYNCHINAE.

661 Pilorhimus albirostris Cab.

Mus. Heiu I, p. 201. — *Ptilonorhynchus albirostris* Rüpp. N. Wirbelth. t. 9. lig. 1. 2.

Häufig in Abyssinien und Kordofan.

662. Juida (Gr.) aenea (Gm.)

Merula viridis longicanda senegalensis Briss. — Turdus aeneus L. — Corvus aureoviridis Shaw. — Lamprocolius aeneus Sund. — Lamprotornis longicauda Sws. — Briss. Orn. II. t 31. — Le Vaill Ois. d'Afr. t. 87. — Sws. Birds of W. Afr. I. t. 7. — Urauges aeneus Cab. Mus. Hcin. I, p. 200. — Hartl. Synops. sp. 263. Mit Ausnahme der nördl. Küstenländer über ganz Afrika verbreitet.

663. Juida Burchelli Smith.

Megalopterus australis A. Sm.? — III. S. Afr. Zool. t. 47. — Urauges australis Cab.
Im südlichen Afrika.

664. Juida aeneoides Nob.

Bonap. Consp. p. 415. — Lamprotornis aeneoides Temm. Afrika.

665. Juida splendens Nob.

Lamprotornis splendens Temm. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 84. Afrika.

666. Juida ignita Gr.

Lamprotornis ignita Licht. Nordmann in Erm. Reise, t. 3. — Gr. Genera of Birds t. 80. — Hartl. Synops. sp. 264. Ilho de Principe, St. Thomé.

667. Juida ptilonorhyncha (Sws.)

Turdus auratus Gm Lath. — Lamprot. Incida Erm. Zool. Atl. t. 3. f. 2. — Sws. Birds of W. Afr. t. p. 140. — Pl. enl. 540. — Le Vaill. Ois, d'Afr. t. 90. — Hartl. Synops. sp. 265. Sud— und Westafrika.

668. Juida chrysonotis (Sw.)

Lampr. splendidus Vieill. — Lampr. fulgida Licht.? — Sws. Birds of W. Afr. I. t. 6. — Vieill. Enc. p. 653. — Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 418. — Fras. Proc. Zool. Soc. 1843. p. 57. — Hartl. Synops. sp. 266. Süd- und Westafrika.

669. Juida nitens (Lin.)

Turdus nitens Gm. — Merula viridis angolensis Briss. Orn. II. t. 30. f. 2. — Pl. enl. 561. — Hartl Synops. sp. 268. Westafrika. (Angola).

670. Juida aurata (Gm)

Turdus auratus L. — Sturnus auratus Daud. — Lamprotornis auratus Licht. — Pl. enl. 540.

Südafrika.

671. Juida cyanotis (Sw.)

Lampr. chaleura Nordm. — Lampr. chalybaea Licht. — Sws. Birds of W. A. I. p. 146. — Rüpp. N Wirbelth. t. 11. 1. 2. av. juv. — Nordm. in Erm. Zool. Atl. p. 8. — Hartl. Synops. sp. 269. — Bonap Consp. p. 415. West? - Afrika.

672. Juida purpureiceps Verr.

Rev. et Mag de Zool. 1851. p. 418. — Strickl. Contrib. to Orn. 1851. p. 133. — Hartl. Synops. sp. 267.

673. Juida earusea (Licht.)

Lampr. corusca Licht. Mus. Berol. — Bonap. Consp. p. 415. Mir unbekannt. (Von "Korosko in Nubien?")

674 Juida chrysogastra (Gm.)

Lampr. chrysogaster Licht. — L. erythrogaster Hempr. et Ehrenb. - Pl. enl. 358. — Bonap. Consp. p. 415. — Notanges chrysogaster Cab.

Abyssinien.

675. Juida superba (Rüpp.) Lamprotornis superba Rupp. — Bonap. Consp. p. 415. — Notanges superbus Cab. Abyssinien.

676. Juida melanogastra (Sws.)

Two Cent. Anim. in Manag. p. 297. sp. 52. — Bonap. Consp. p. 415. — Hartl. Synops. sp. 270. Senegambien.

677. Juida chlaroptera (Sws.)

Lamprotornis chloropterus Sws. Two Cent. p. 297. — Bonap. Consp. p. 416. — Hartl. Synops sp. 271.
Westafrika.

678. Juida phoenicoptera (Sws.)

Nabiroh Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 89. Sws. Two Cent. p. 360. Bonap. Consp. p. 416.

679. Juida rufiventris (Rüpp.)

N Wirbelth, t. 11, fig. 1. — Hartl, Synops, sp. 272. In Ost- und Westafrika.

(Beschr. des Nestes und Eies s. m. Beitr. z. Orn. Afr. t. XXVII. f. 4)

680. Juida tenuirostris (Rüpp.) N. Wrblth. t. 10. f. 1.

Abyssinien.

681. Spreo (Less.) bicolor Blyth.

Turdus bicolor Gm. Lamprotornis albiventer Sws. — Lampr. bicolor Licht. — Notauges bicolor Cab. Mus. Hein. 1, p. 198. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 88. — Bonap. Consp. p. 416.

682 Spreo morio (Daud.)

Turd. morio Lin. — Corvus rufipennis Shw. — Astrapia morio Blyth. — Amydrus morio Cab

Südafrika.

683. Spreo fulvipennis (Sws.)

Lamprot. fulvipennis Sws. Anim in Menag. (Two Ceut.) p 298. f. 49 a. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t 91. — Bonap. Consp. p. 416. — Hartl. Synops. sp. 273
Süd- und Westafrika.

684. Onychognathus fulgidus Hartl.

Rev. et Mag. de Zool. 1849. t. 14 f. 2, 3. — Hartl. Beitr. zur Orn. W. A. t. 7.

Insel St. Thomè.

685. Calornis leucogastra (Gm.)

Turd, leucogaster L. — Lamprot, leucogaster Sws, — Pholidauges leucogaster Cab. Mus. Hein. I, p. 198. — Pl. enl. 648. f. 1. — Sws. Birds of W. Afr I. t. 8. — Bonap. Consp. p. 416. — Hartl. Synops. sp. 275.

686. Saraglossa madagascariensis Gr.

Turdus madagascariensis Herm. Pl. enl 557, f. 1. — Bonap Consp. 418.

2. Subfam. BUPHAGINAE.

687. Buphaga africana L.

B. rufescens Vieill. Gal. t. 93. — Pl. enl. 293. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 97. — Gray Gen. of Birds t. 82. Ind Süd- und Westafrika.

688. Buphaga erythrorhyncha Stanley.

B. habessinica Ehrenb. Symb. phys. t 9. — Pl. col. 465. In Abyssinien und Madagascar.

3. Subfam. EURYCEROTINAE.

689. Euryceros Prevosti Less.

Cent. Zool t. 74. - Illustr Zool, t. 13. - Bp. Cousp. p. 423. Madagascar.

4. Subfam. STURNINAE.

690. Pastor roscus Wagl.

Turd. selencis Gm. — T. suratensis Lath. — Sturn. roseus Scop. — Pl. enl. 251 — Edw. Birds t. 250. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 96. — Bonap. Faun. ital. av. t. 4. — Gould Birds Eur. 212. Verstreicht sich zuweilen nach Nordafrika.

691. Acridotheres pagodarum Vieill.

Sturnus subroseus Shaw. - Maina sulvestris Hodgs. - Gracula pagodarum Daud. — Sturnia pagodarum Blyth. — Pastor pagodarum Wagl. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 92. 1. — Mem. Soc. Copenli, III. t. 8. - Wagl. Syst. av. sp. 8 - Temenuchus pagodarum Cab

Nach Wagler zufällig in Südafrika?

692. Dilophus carunculatus Gr.

Gracula carunculata Gm. — Gr. larvata Shaw. — Gr. gallinacea Dand. — Dilophus gallinaceus Vieill — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 93 1, 2 et 94. 1, 2.

Aus Süd- und Nord-Ost-Afrika.

693. Sturnus vulgaris L

St. varius Meyer. - Pl. enl. 75. - Gould Birds Eur. t. 210. - Naum. Vgl. Deutschl. t.

In Unter-Egypten häufig.

694. Sturnus unicolor Marm.

Pl. col. 111. - Gould Birds Eur. t. 211.

Ich erhielt ein Individuum in Algier; in Marocco, Egypten und sonstigen Ländern Afrika's von mir nicht bemerkt.

III. FAM. FRINGILLIDAE.

Subfam. PLOCEINAE.

695. Alecto albirostris (Sws.)

Textor alecto Temm. - Dertroïdes albirostris Sws. Birds of W. Afr. I. p. 163. - Pl. col. 446. - Less. Traité d'Orn. p. 433. Bonap. Consp. p. 438 — Hartl. Syn. sp. 277.

Abyssinien, Sennaar, (Kordofan?) Senegambien.

696. Alecto erythrorhyncha (Sm.)

Textor erythrorhynchus Sm. Ill, S. Afr. Zool, Av. t. 64. -Bonap. Consp. p. 438.

Südafrika.

697. Alecto dinemelli Horsf.

Gr. Gen. of Birds t. 87. 1. - Rüpp. System. Uebers. d. Vgl. N.O.Afr. t 30. — Bonap. Consp p. 438. Abyssinien.

698. Alecto panicivora (Lin.)

Pyrrhula africana nigra Briss. Orn. III. p. 317. - Loxia panicivora Lin. - Hartl. Synops. sp 278.

Westafrika?

699. Sycobius cristatus Vieill.

Malimbus cristatus Vieill. — Ploceus cristatus Vieill. — Tanagra malembica Daud. - Vieill, Ois, chant t. 42, - Daud. Ann. du Mus. II t. 10. - Bouap. Consp. p. 438. - Hartl Syn. sp. 279. Westafrika. (Congo.)

700. Sycobius malimbus Temm.

Malimbus cristatus fem. Vieill. - Fringilla textrix Licht. -Sycob. rubricollis Sws. - Ploceus fasciatus Steph. - Euplectes rufovelatus Fras. — Vieill. Ois. chant. t. 43. — Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 419. — Strickl. Contrib. 1851. p. 133. — Bonap. Consp. p. 438. — Hartl. Synops. sp. 280.

Westafrika, Fernando Po.

701. Sycobius melanotis Lafrén.

Ploc. erythrocephalus Rüpp. — Lafr. Rev. Zool. 1839. p. 20. — Guér. Mag. de Zool. 1839. t. 7. — Rüpp. Syst. Uebers. N.O.A. p. 71. — Less. Descript. Mam. Ois. p. 334. Id. Echo du M. Sav. 1844. p. 31. — Bonap. Consp. p. 438. — Hartl. Syn. sp. 106. Senegambien, Abyssinien.

702. Sycobius leuconotos v. Müll.

Ploc. leuconotos v. Müll. Naum. 1851. IV. p. 28. — Major cinereus; capite, collo et pectore igneo rubro; loris, regione orbiculari et mento nigro; medio dorsi abdomineque albido; remigibus et tectricibus exterioribus igneo-marginatis.

Abyssinien.

703. ? Sycobius rubriceps Sundev.

Mus. Holm. Bonap. Consp. p. 438.

Südafrika.

704. Sycobius nitens Gr.

Gen. of Birds t. 87. 2. -- Sundev. Oef. K. V. Ac. Förh. p. 158. -- Bonap. Consp. p. 439. -- Hartl. Synops. sp 283. Sierra Leone.

705. Sycobius scutatus Cassin

Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. IV. p. 157. — Journ. Acad. I. p. 297. t. 41. 1 et 2. — Bonap. Consp. p. 439. — Hartl. Syn. sp. 282. Sierra Leone.

706. Sycobius nigerrimus Vieill.

Ploc. nigerrimus Vieill. — Pl. niger Sws. Menag. p. 306. — Vieill. Enc. meth. Orn. p. 700. — Id. Dict. 34. p. 130. — Bonap. Consp. p. 439. — Hartl. Synops. sp. 284.

Angola.

707. Symplectes (Sws.) nigricollis (Vieill.)

Ploc. nigricollis Vieill. — Ploc. atrogularis Voigt. — Sycobius nigricollis Gr. — Vieill. Ois. chant. t. 45. Id. Encycl. p. 699.

Id. Dict d'Hist. N. p. 129 — Cuv. Voigt. 1 p 164 — Bonap. Consp. p. 439. — Hartl. Syn. sp. 285.

Westafrika (Malimbe.)
708 Symplectes bicolor Vieill.

Ploc. bicolor Vieill. — Fringilla gregalis Licht. — Pl. chrysogaster Vig. — Symplectes chrysomus Sws. — Eupodes xanthosomus Jard. — Hyphantornis chrysogaster Gr. — Sycobrotus bicolor Cab. Mus. Ilcin, 1. p. 182. — Vieill. Enc. p. 698. — Licht. Doubl. p. 23. — Jard. Selb. Ill. new ser. t. 10. — Sws. Birds W. A. I. p. 170. — Hartl. Synops. sp. 286. — Bp. Consp. p. 439. Süd- und Westafrika.

709. Symplectes St. Thomae Hartl.

Sycob. St. Thomae Hartl. Rev. Zool. 1848. p. 109. Id Beitr. zur Orn. W. Afr. t. 9. — Bp. Consp. p. 439. — Hartl. Syn. sp. 287. Insel St. Thomä.

710. Symplectes princeps Bonap.

Consp. p. 439. — Hartl. Synops. sp. 288.

Ilho do principe.

711. Nelicurvius (Bp.) pensilis (Gm.)

Loxia pensilis Gm. — Loxia nelicurvi Scop. — Ploc. nelicurvi Gr. — Sonnini Voy. Ind. t. 17.

Madagascar.

712. Hyphantornis aurantia Gray.

Pl. aurantius Vieill. Enc. p. 700. — Id Ois. chant. t. 44. — Sws. Menag. p. 306. — Bp. Consp. p. 440. — Hartl. Syn. sp. 289. Angola.

713. Hyphantornis ocularia Gr.

Ploc. ocularius Sm. III. S. A. Zool. Av. t. 30, 2, m. - Hyphanturgus ocularius Cab. Mus. Hein. I. p. 182. Südafrika.

714. Hyphantornis brachyptera Gr.

Ploc. brachypterus Sws. Birds of W. Afr. 1. t. 10. — Fras. Proc. Zool. Soc. 1843. p. 52. — Bonap. Consp. p. 440. — Hyphanturgus brachypterus Cab. Mus. Hein. 1. p. 182. — Hartl. Synops. sp. 290.

Senegambien, Fernando Po.

715. Hyphantornis personata Gr.

Ploc. personatus Vieill. — Pl. melanotis Sws. — Vieill, Gal. d'Ois t. 84. — Sws. Menag. p. 307. fig. 56. — Jard. Contrib. 1848. — Bonap. Consp. p. 440. — Hartl. Synops. sp. 291. Westafrika.

716. Hyphantornis flavocapilla (Vieill.)

Ploc. flavocapillus Vieill. Dict. Hist. N. Vol 34. p. 127. — Id. Encycl p 698. — Hartl. Synops sp. 292.

Congo.

717. Hyphantornis grandis Gr.

Ploc. grandis Gr. — Pl. collaris Fras. — Gr Gen. of Birds part. I. — Fras Proc Zool S. 1842. p. 142. — Allen Ex. Nig. II. p. 499. — Fras Zool. Typ. VII t 2. — Hartl Syn. sp. 293. Insel St Thomae.

718. Hyphantornis textor Nob.

Oriolus textor Gm. — Loxia melanocephala Gm. — Fring. longirostris Vieill. — Pl. senegalensis Steph. — Fring. senegalensis Briss — Textor melanocephalus Bonap. — Pl. modestus Hartl. Gm. 1 392. — Licht. Doubl. p. 23. — Vieill. Enc. p. 591. — Sws. Zool Ill. n. s. t. 37. Birds of W. A. I. p. 167. — Fras. Proc. 1843. p. 51. — Briss. Orn. III. 173. — Sundey. Oefers. 1849. p. 158. — Bonap. Consp. p. 440. — Hartl. Rev. Zool. 1845. p. 406 fem. — Id. Synops. sp. 294. West- und Süd-West-Afrika.

719. Hyphantornis capitalis Neb

Tanagra capitalis Lath. — Fr. capitalis Licht. — Ploc. capitalis Less. — Pl. velatus Vieill. — Lath. Ind. Orn. I. 432. — Id. Gen Hist. VI. t. 94. — Licht Doubl. p. 23. — Less. Compl. VIII. p. 308. — Vieill. Enc. p. 702. — Hartl. Synops. sp. 295. Senegambien.

720. Hyphantornis cucullata (Sws.)

Pl. cucullatus Sws. — Textor cucultatus Bonap. — Sws. Birds of W. A. II. p. 261. — Id. Menag. p 307. — Bonap. Consp. p. 441. — Hartl Synops. sp. 296.

Senegambien.

721. Hyphantornis vitellina (Licht)

Fr. vitellina Licht. — Pl. ruficeps Sws. — Textor vitellinus Bonap. — Licht. Doubl. p. 23. — Sws Birds of W. Afr. II. p. 262. Id. Menag. p. 408. — Bonap Consp. p 441. — Hartl. Syn sp.

722. Hyphantornis sublarcata v. Müll.

Ploc. sublarvatus v. Müll. Naumannia, 1851. IV. p. 28. — v. Müll. Beitr. z. Orn. Afr. t XII — Pl. intermedius Rüpp.? Syst. Uebers. d. Vgl. N.O.A. p. 71?

Kordofan und Abyssinien.

723. Hyphantornis larvata (Rüpp.)

Pl. larvatus et flavoviridis Rüpp. N. Wirbelth. t. 32 1 m. Uebers, N.O.A. t. 29 fem.

Abyssinien.

724. Hyphantornis spilonota (Vig.)

Pl. spilonotus Vig. — Pl. stictonotus Sm. — Pl. flaviceps Sws. Birds of W. A. II. t 32. — Sm. S. Afr. Quat. Journ. no. 5, p. 11. Id. III. S. Afr. Zool t, 66 1.

West- und Südafrika.

725. Hyphantornis capensis Gr.

Pl. abyssinicus Less. — Pl. capensis Sm. Ill. S Afr. Zool. Av. t 66. 2. m — Bonap. Consp. p. 440.

726. Hyphantornis aurifrons Gr.

Pl. aurifrons Temm — Pl. icterocephalus Sws. — Pl. col. 175. 176. — Bonap. Consp. p. 440.

Südafrika

727 Hyphantornis Grayi Verr.

Rev. et Mag. de Zool 1851, p. 514 —

Rev. et Mag. dc Zool. 1851. p. 514. - Hartl. Synops. sp. 300. Gaboon.

728. Hyphantornis melanotis v. Müll.

Pl. melanotis Guér — Pl. auricularis Prev. — Hyphantornis Guerini Gr. O. des Murs Voy. Lefeb. — v. Müll Beitr. z. Orn. t. XX. Ost-Afrika, (Abyssinien, Sennaar, Kordofan und südl Nubien.)

729. Hyphantornis flaviguta Hartl.
Pl. flaviguta Hartl. — v. Müll. Beitr. zur Orn. Afr. t. XX.
Westafrika.

730. Hyphantornis lutcola (Licht.)

Fring. luteola Licht. Donbl. p. 23. — Sitagra luteola Cab. Mus. Hein. l. p. 181. — Hartl. Synops. sp. 302 Kafferland.

731. Hyphantornis collaris (Vieill.)

Pl. collaris Vieill. Enc. p. 699. — Id. Dict. d'Hist. Nat. 34.
p. 129. — Bonap. Consp. p. 441. not. — Hartl. Synops. sp. 303. Westafrika, (Congo, Senegal.)

- 732. Hyphantornis castaneofusca (Less)

Pl. castaneofuscus Less. Rev. Zool. 1840. p. 99. — Bonap. Consp. p 442. — Hartl. Synops. sp. 305. Senegambien.

733. Hyphantornis isabellina (Less.)

Pl. isabellinus Less. Rev. Zool 1840. p. 226. — Hartl. Syn. sp. 306. Sierra Leone.

734. ? Hyphantornis tricolor Hartl. Pl. collaris J. E. Gray. Zool. Misc. I. p. 6. — Hartl. Syn. sp. 304. Sierra Leone.

735. Hyphantornis subaurea Gr. Pl. subaureus Sm. Ill. S. Afr. Zool. t 30. t. m. – Bp Consp. p. 441. Südafrika.

736. Hyphantornis mariquensis Gr.

Ploc. mariquensis Sm. III, S. A. Zool. t. 103. — Bp. Consp. p. 441. Südafrika.

737. Hyphantornis nigrifrons Cab. Mus. Hein. 1, p 182. Kafferland.

738. Hyphantornis galbula Gr. Pl. galbula Rüpp. N. Wrhlth. t. 32. 2. – Bp. Consp. p. 441. Abyssinien

739 Hyphantornis rubiginosa Gr.

Pl. rubiginosus Rupp. N. Wrblth. t. 33, 1, — Bp. Consp. p. 442. Abyssinien.

740 Ligurnus (Reichb.) olivaceus (Fras.)

Coccothraustes olivaceus Fras Proc. Zool. Soc. 1842. p. 144. — Id Zool. typica part. X. — Allen Exp. Nig II. p. 500. — Hartl. Synops. sp. 307.

741. Plocepasser mahali Sm.

Leucophrys pileatus Sws. — Ploceus haematocephalus Licht. — Agrophilus mahali Cah. — Philagrus mahali Cab. Mus. Hein. I, p. 179. — Smith III S. Afr. Zool. Av. t. 63. m. — Bp. Consp. p. 443. Südafrika.

742. Plocepasser superciliasus Rüpp.

Placeus superciliasus Rüpp. — Agrophilus superciliasus Sws. — Rüpp. Atl. t. 15. — Sws. Birds of W. A. I p. 209. — Bp. Consp. p. 444. — Philagrus superciliasus Cab. — Lefebr. Voy. en Abyss. t. 9. 2. — Allen Exp. Nig. I. p. 310. — Hartl. Syn. sp. 308. Kordofan, Darfur, Senegambien, Nigritien.

(Schluss folgt.)